

University of Groningen

Het carcinoma renis en het nefrablastoom. Diagnostiek en therapie

Koopal, Sjouke Andries

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Document Version

Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:

1965

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

Citation for published version (APA):

Koopal, S. A. (1965). *Het carcinoma renis en het nefrablastoom. Diagnostiek en therapie.* [, Rijksuniversiteit Groningen]. [S.n.].

Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

STELLINGEN

1. Wanneer de diagnose nefroblastoom (Wilms-tumor) gesteld is, zal men terstond laparotomie moeten verrichten.
2. De voor het vervaardigen van kleurstof-verdunningscurven frequent gebruikte kleurstof indocyanine-groen volgt de wet van Lambert-Beer niet.
3. Verhoogde intracranieële druk, gevolgd door passage van liquor door de lamina cribrosa, is de voornaamste oorzaak van de niet-traumatische nasale liquorrhoe.
4. Het is te betreuren dat in ons land, waar traditioneel de preventieve geneeskunde een belangrijke plaats heeft ingenomen, nog geen 'screening' studies bij pasgeborenen worden uitgevoerd voor een zo vroeg mogelijke diagnostiek van bepaalde aangeboren stofwisselingsziekten.
5. Bij het gebruik van de vacuumextractor behoeft geen rekening te worden gehouden met het bestaan van stoornissen in de spildraai.
6. In de therapie van de chronische discoïde erythematodes dient aan een locale behandeling de voorkeur te worden gegeven.
7. De patholoog-anatomische bewering dat in de kamerhoek bij het congenitaal glaucoom geen endotheel aanwezig is, moet op grond van klinische gegevens sterk in twijfel worden getrokken.
8. Het onbrandbaar maken van kinderkleding, vooral van nachtgoed, kan het aantal dodelijke verbrandingen bij kinderen aanzienlijk verminderen.
9. Acute bovenbuiksklachten e causa ignota maken een reactietest volgens Cassoni en Weinberg noodzakelijk.

10. Het valt te overwegen om bij de embolectomie in de arteriële circulatie van de extremiteiten, gebruik te maken van de gemodificeerde Dormia-catheter volgens Henson.

Henson, W.C.S.: Surg. Gynec.Obstet., 121 : 598, 1965

11. In de organisatie van de hulpverlening bij rampen komt de ervaring van een chirurg meer tot zijn recht in het opvangcentrum dan in de ambulance.
12. Het voortbestaan van de wereldbevolking is niet in eerste instantie afhankelijk van de voedselproductie.

Stellingen behorende bij Sj. A. Koopal
Het carcinoma renis en het nefroblastoom
Groningen 1965